

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT



**PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE**
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA




**EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA**
SPOLOČNE BEZ HRANÍC



TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU
MIKROPROJEKTŮ SPRÁVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY





HIMYZ



L.Popelka, D.Pagáč, J.Ovísek VII.A



TESAŘÍK ALPSKÝ

- Původní v bukových lesích vyšších poloh od 600 - 1000 m.
- Pravděpodobně největší naleziště je v Českém ráji, ale v současné době se vyskytuje i v Polabí, na Jižní Šumavě a v Bílých Karpatech.



JASOŇ ČERVENOOKÝ

- České republice byl ve 20. století vyhuben, ale v roce 1986 znovu vysazen, jde o kriticky ohrožený druh.
- Je to velký motýl (rozpětí křídel 7–8,4 cm) s bílými křídly s černými a červenými skvrnami, housenka je černá s oranžovými skvrnami, kukla je červenohnědá, ojíňená modrobílým práškem, vajíčko je bílé, o rozměrech asi 1–1,5 mm.



OTAKÁREK FENYKLOVÝ

- Otakárek fenyklový patří mezi nejkrásnější a největší denní motýly ČR (dosahuje velikosti až 7 cm). Patří mezi ohrožené druhy motýlů ČR.
- Nejčastěji se vyskytuje na loukách a lesních světlinách, ale i na zahradách, kde samičky často kladou vajíčka.



ROHÁČ OBECNÝ

- Žije v dutinách starých stromů a v mrtvých pařezech v lesích a hájích. S odstraňováním starých stromů a pařezů mizí i přirozené prostředí a zdroj obživy tohoto brouka.
- V České republice byl rozšířen v listnatých lesích po celém území, dnes je však jeho výskyt lokalizován do několika oblastí. Nejhojněji se pak vyskytuje na jižní Moravě.



CHROUST OBECNÝ



- Chroust obecný je velký brouk měřící až 3 cm, létající obvykle za soumraku, kdy může svými nálety člověka obtěžovat.
- V polovině 20. století byl kvůli používání pesticidů téměř vyhuben, ale od 80. let, kdy se omezilo používání pesticidů (chemických postřiků) se jeho stavy opět zvyšují.



LÝKOŽROUT SMRKOVÝ

- Je malým nenápadným broučkem. Tělo je válcovité, černohnědé zbarvené, lesklé, se světle žlutými chloupky. Tykadla jsou paličkovitá s lomeným švem.
- Dorůstá velikosti 4 - 5,5 mm.
- Dospělá larva je dlouhá 4-5 mm, bílá, se žlutohnědou hlavou. Kukla je bílá a měří asi 4 mm.



KONEC



ZDROJE:

- http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDlu%C5%A5%C3%A1sek_%C5%99e%C5%A1etl%C3%A1kov%C3%BD
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Chroust_obecn%C3%BD
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Babo%C4%8Dka_pav%C3%AD_oko
- http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDko%C5%BErout_smrkov%C3%BD
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Tesa%C5%99%C3%ADk_alpsk%C3%BD
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaso%C5%88_%C4%8Dervenook%C3%BD
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Otak%C3%A1rek_fenyklov%C3%BD
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Hroba%C5%99%C3%ADk_obecn%C3%BD
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Roh%C3%A1%C4%8D_obecn%C3%BD

